

Παράρτημα. Χαρακτηριστικά δηλωθέντων κρουσμάτων λοίμωξης από ιό Δυτικού Νείλου (ΔΝ), Ελλάδα, 2010-2023 (Πηγή: ΕΟΔΥ)

Πίνακας 1. Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων λοίμωξης από ιό ΔΝ, αριθμός θανάτων (% θνητότητα) σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό [στο σύνολο των κρουσμάτων και στα κρούσματα με προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ)], επίπτωση νόσου με προσβολή ΚΝΣ, Ελλάδα, 2010-2023 (Πηγή: ΕΟΔΥ)**

Μεταβλητή	Έτος														Σύνολο 2010-2023
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Σύνολο κρουσμάτων	262	100	161	86	15	0	0	48	317	227	145	59	286	162	1.868
Κρούσματα με προσβολή ΚΝΣ (%)	197 (75%)	75 (75%)	109 (68%)	51 (59%)	14 (93%)	0	0	28 (58%)	243 (77%)	140 (62%)	116 (80%)	38 (64%)	184 (64%)	119 (73%)	1.314 (70%)
Επίπτωση νόσου με προσβολή ΚΝΣ (ανά 100.000 πληθ)	1,8	0,7	1,0	0,5	0,1	0	0	0,3	2,2	1,3	1,1	0,4	1,7	1,1	0,9*
Αριθμός (%) θανάτων	35 (13%)	9 (9%)	18 (11%)	11 (13%)	6 (40%)	0	0	5 (10%)	51 (16%)	35 (15%)	23 (16%)	8 (14%)	33 (12%)	23 (14%)	257 (14%)
Αριθμός (%) θανάτων ασθενών με προσβολή ΚΝΣ	33 (17%)	9 (12%)	18 (17%)	10 (20%)	6 (43%)	0	0	5 (18%)	48 (20%)	33 (24%)	23 (20%)	7 (18%)	33 (18%)	23 (19%)	248 (19%)

* Μέση ετήσια επίπτωση ετών 2010-2022

** Καταγράφονται οι θάνατοι ασθενών με λοίμωξη από ιό ΔΝ, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

Πίνακας 2. Αριθμός και ποσοστό κρουσμάτων λοίμωξης από ιό ΔΝ με προσβολή του ΚΝΣ ανά κλινική μορφή νευρο-δισιδυτικής νόσου (με προσβολή ΚΝΣ), Ελλάδα, 2010-2023 (Πηγή: ΕΟΔΥ)

Κλινική μορφή νευρο-δισιδυτικής νόσου	%	Αριθμός κρουσμάτων
Εγκεφαλίτιδα/ Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα	88%	1.159
Μηνιγγίτιδα	11%	140
Οξεία χαλαρή παράλυση (ΟΧΠ) μόνο	1%	15
ΟΧΠ +/- εγκεφαλίτιδα/μηνιγγίτιδα*	4%*	55*
Σύνολο κρουσμάτων με προσβολή του ΚΝΣ	100%	1.314

* Συμπεριλαμβάνονται και στις ανωτέρω κατηγορίες.

Πίνακας 3. Αριθμός και ποσοστό κρουσμάτων λοίμωξης από ιό ΔΝ με προσβολή του ΚΝΣ ανά ηλικιακή ομάδα, Ελλάδα, 2010-2023 (Πηγή: ΕΟΔΥ)

Ηλικιακή ομάδα (έτη)	%	Αριθμός κρουσμάτων
<20	1,4	19
20-29	1,4	18
30-39	3,4	45
40-49	3,8	50
50-59	9,1	119
60-69	17,5	230
70-79	33,9	445
≥80	29,5	388
Σύνολο	100	1.314

Πίνακας 4. Ποσοστά (%)* περιστατικών με λοίμωξη από ιό ΔΝ, με και χωρίς προσβολή του ΚΝΣ, ανά αναφερόμενο σύμπτωμα/ σημείο, Ελλάδα, 2010-2023 (Πηγή: ΕΟΔΥ)

Σύμπτωμα (αναφερόμενο)/Σημείο	Ποσοστό (%) περιστατικών ΜΕ προσβολή ΚΝΣ με το αναφερόμενο σύμπτωμα/σημείο	Ποσοστό (%) περιστατικών ΧΩΡΙΣ προσβολή ΚΝΣ με το αναφερόμενο σύμπτωμα/σημείο
Πυρετός	99%	91%
Γενικευμένη αδυναμία/ καταβολή/κόπωση	78%	77%
Σύγχυση	77%	22%
Κεφαλαλγία	62%	61%
Υπνηλία	60%	27%
Ανορεξία	57%	51%
Διάρροια/ ναυτία/ έμετος	52%	47%
Ρίγος	51%	44%
Αίσθημα ζάλης	42%	26%
Αρθραλγίες/ μυαλγίες	37%	47%
Τρόμος/ εξωπυραμιδικά συμπτώματα	32%	2%**
Ασάθεια	26%	2%**
Εξάνθημα	16%	31%
Κοιλιακό άλγος	14%	17%
Παρέσεις/ παραλύσεις	13%	0%
Οπισθοβολβικός πόνος	12%	17%
Αιμωδίες	11%	5%
Θάμβος όρασης	9%	3%
Διογκωμένοι Λεμφαδένες	5%	16%

* Τα ποσοστά υπολογίσθηκαν επί των περιστατικών για τα οποία ήταν γνωστή η σχετική πληροφορία.

** Σύμπτωμα κατά αναφορά των ίδιων των ασθενών (ή συγγενών τους).

Σε κάθε τυχόν περαιτέρω χρήση των ανωτέρω επιδημιολογικών δεδομένων, παρακαλούμε όπως αναφέρετε ότι η πηγή τους είναι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας («Πηγή δεδομένων: ΕΟΔΥ»).