

**Παράρτημα. Χαρακτηριστικά δηλωθέντων κρουσμάτων λοίμωξης από το Δυτικού Νείλου (ΔΝ),  
Ελλάδα, 2010-2022 (Πηγή: ΕΟΔΥ)**

**Πίνακας 1. Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων λοίμωξης από το ΔΝ, αριθμός θανάτων\*\* (%) θνητότητα) σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ίδιο [στο σύνολο των κρουσμάτων και στα κρούσματα με προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ)], επίπτωση νόσου με προσβολή ΚΝΣ, Ελλάδα, 2010-2022 (Πηγή: ΕΟΔΥ)**

Μεταβλητή	Έτος												Σύνολο 2010-2022	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Σύνολο κρουσμάτων	262	100	161	86	15	0	0	48	317	227	145	59	286	1.706
Κρούσματα ΜΕ προσβολή ΚΝΣ (%)	197 (75%)	75 (75%)	109 (68%)	51 (59%)	14 (93%)	0	0	28 (58%)	243 (77%)	140 (62%)	116 (80%)	38 (64%)	184 (64%)	1.195 (70%)
Επίπτωση νόσου με προσβολή ΚΝΣ (ανά 100.000 πληθ.)	1,8	0,7	1,0	0,5	0,1	0	0	0,3	2,2	1,3	1,1	0,4	1,7	0,9*
Αριθμός (%) θανάτων	35 (13%)	9 (9%)	18 (11%)	11 (13%)	6 (40%)	0	0	5 (10%)	51 (16%)	35 (15%)	23 (16%)	8 (14%)	33 (12%)	234 (14%)
Αριθμός (%) θανάτων ασθενών με προσβολή ΚΝΣ	33 (17%)	9 (12%)	18 (17%)	10 (20%)	6 (43%)	0	0	5 (18%)	48 (20%)	33 (24%)	23 (20%)	7 (18%)	33 (18%)	225 (19%)

\* Μέση ετήσια επίπτωση ετών 2010-2022

\*\* Καταγράφονται οι θάνατοι ασθενών με λοίμωξη από το ΔΝ, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

**Πίνακας 2. Αριθμός και ποσοστό κρουσμάτων λοίμωξης από το ΔΝ με προσβολή του ΚΝΣ ανά κλινική μορφή νευρο-διεισδυτικής νόσου (με προσβολή ΚΝΣ), Ελλάδα, 2010-2022 (Πηγή: ΕΟΔΥ)**

Κλινική μορφή νευρο-διεισδυτικής νόσου	%	Αριθμός κρουσμάτων
Εγκεφαλίτιδα/ Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα	88%	1.048
Μηνιγγίτιδα	11%	133
Οξεία χαλαρή παράλυση (ΟΧΠ) μόνο	1%	14
ΟΧΠ +/- εγκεφαλίτιδα/μηνιγγίτιδα*	4%*	52*
<b>Σύνολο κρουσμάτων με προσβολή του ΚΝΣ</b>	<b>100%</b>	<b>1.195</b>

\* Συμπεριλαμβάνονται και στις ανωτέρω κατηγορίες.

**Πίνακας 3. Αριθμός και ποσοστό κρουσμάτων λοίμωξης από το ΔΝ με προσβολή του ΚΝΣ ανά ηλικιακή ομάδα, Ελλάδα, 2010-2022 (Πηγή: ΕΟΔΥ)**

Ηλικιακή ομάδα (έτη)	%	Αριθμός κρουσμάτων
<20	1,6	19
20-29	1,4	17
30-39	3,4	41
40-49	3,8	46
50-59	9,5	113
60-69	17,6	210
70-79	33,1	395
≥80	29,6	354
<b>Σύνολο</b>	<b>100</b>	<b>1.195</b>

**Πίνακας 4. Ποσοστά (%)\* περιστατικών με λοίμωξη από το ΔΝ, με και χωρίς προσβολή του ΚΝΣ, ανά αναφερόμενο σύμπτωμα/ σημείο, Ελλάδα, 2010-2022 (Πηγή: ΕΟΔΥ)**

Σύμπτωμα (αναφερόμενο)/Σημείο	Ποσοστό (%) περιστατικών ΜΕ προσβολή ΚΝΣ με το αναφερόμενο σύμπτωμα/σημείο	Ποσοστό (%) περιστατικών ΧΩΡΙΣ προσβολή ΚΝΣ με το αναφερόμενο σύμπτωμα/σημείο
Πυρετός	99%	92%
Σύγχυση	77%	23%
Γενικευμένη αδυναμία/ καταβολή/κόπωση	77%	76%
Κεφαλαλγία	62%	62%
Υπνηλία	58%	28%
Ανορεξία	56%	52%
Ρίγος	50%	45%
Διάρροια/ ναυτία/ έμετος	51%	47%
Αίσθημα ζάλης	40%	25%
Αρθραλγίες/ μυαλγίες	36%	46%
Τρόμος/ εξωπυραμιδικά συμπτώματα	32%	2%**
Αστάθεια	27%	2%**
Εξάνθημα	17%	32%
Κοιλιακό άλγος	15%	17%
Παρέσεις/ παραλύσεις	13%	0%
Οπισθοβολβικός πόνος	11%	18%
Αιμωδίες	10%	5%
Θάμβος όρασης	9%	3%
Διογκωμένοι Λεμφαδένες	4%	14%

\* Τα ποσοστά υπολογίσθηκαν επί των περιστατικών για τα οποία ήταν γνωστή η σχετική πληροφορία.

\*\* Σύμπτωμα κατά αναφορά των ίδιων των ασθενών (ή συγγενών τους).

Σε κάθε τυχόν περαιτέρω χρήση των ανωτέρω επιδημιολογικών δεδομένων, παρακαλούμε όπως αναφέρετε ότι η πηγή τους είναι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας («Πηγή δεδομένων: ΕΟΔΥ»).